

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RAMACTO 70 WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid700 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2773 - SENASA

Titular del registro:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.
Dirección: Calle Pucalá 324 Dpto. 201 Urb. C.C.
Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Lima – Perú.
Tel. +51 983275666

Formulador:

QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD.
Room 304, Haier Road No. 63, Qingdao City,
Shangdong, China
Tel: +86 53280995916 Fax: +86 53280995916

Importador y distribuidor:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.
Dirección: Calle Pucalá 324 Dpto. 201 Urb. C.C.
Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Lima – Perú.
Tel. +51 983275666

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
Teléfono del titular: Advangrow Agrosience Perú S.A.C. (511) 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela a un depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligros para abejas y artrópodos.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - No aplicar el producto cuando haya probabilidad del movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAMACTO 70 WDG, es un insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos causando un bloqueo, lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

RAMACTO 70 WDG puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **RAMACTO 70 WDG** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa sin grumos. Adicionar más agua removiendo continuamente y agregar a través de una malla o cedazo, este preparado, verterlo al tanque de aplicación el cual contiene el resto del agua. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto, mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (g/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Minador de hojas	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.05-0.075	21	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Número máximo de aplicaciones por campaña: 02
- Número de campañas por año: 01 para el cultivo de mandarina.
- Aplicar al inicio de la infestación de la plaga y cuando se den las condiciones favorables para la reproducción de la misma.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RAMACTO 70 WDG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, exceptuando materiales oxidantes, alcalinos, ácidos fuertes y abonos foliares.

Antes de realizar la mezcla es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad o consultar con nuestro departamento técnico.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

