

19.1 cm

5.8 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino por ingestión; no ingerir.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Espinosinas (Lactona macrocíclica).
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de emergencias:**  
**CICOTOX: (01) 328-7700 / ESSALUD: (01) 411-8000**  
**POINT ANDINA: (01) 348-1018 / 349-9609**

# ULTIMATUM

## 120 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Spinosad..... 120 g/L  
Aditivos..... CSP 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA



**Point**  
EN REGIMEN  
COMERCIAL

**Titular del Registro, Importado y Distribuido:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B  
Santiago de Surco, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 348-1018 - 349-9609

**Formulado por:**  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China.

Contenido Neto: **0.25 L**  
N° de Lote:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:  
**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ULTIMATUM 120 SC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Pertenece al grupo de las spinosinas y actúa sobre el sistema nervioso del insecto, sobre estimulando sus neuronas motoras, lo que causa temblores, falta de coordinación, parálisis y finalmente su muerte.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	50 - 75	3	0.3

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).  
P.C.: Periodo de Carencia en días.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

- Aplicar previa evaluación de la plaga y de preferencia en las tardes.
- Como máximo 2 aplicaciones / campaña, con un intervalo de 7 días y solo cuando la densidad de la plaga lo justifique.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.**

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA