

Medidas: 21 cm x 14.5 cm
11 de Enero del 2021
AG

TIRA

KILLGRAMIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin..... 400 g/L
Bensulfuron methyl..... 25 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular de registro:
MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 10L

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARNIZ
(NO IRA IMPRESO)



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Medidas: 21 cm x 14.5 cm
11 de Enero del 2021
AG

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Causa irritación moderada de los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonylurea + Dinitroaniline.
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0-80013040
ESSALUD: 411-800, opción 4
INFOSALUD: 113
MONTANA: 419-3000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros”.



- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”.
- “No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- KILLGRAMIN es un herbicida pre-emergente y post-emergente temprano recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta en el cultivo de arroz que es absorbido por raíces y meristemas.
- KILLGRAMIN es una combinación química de los ingredientes activos: pendimethalin, que actúa inhibiendo la mitosis y división celular en los puntos de crecimiento o meristemas de tallo y raíces y bensulfuron methyl, que inhibe la síntesis de aminoácidos, interrumpiendo la división celular y el crecimiento de las malezas.
- KILLGRAMIN puede ser aplicado con botellín (aplicación directa), pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr un completo mojamiento del área a tratar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de control deberán realizarse en los primeros días después del transplante del arroz, para ello se deberá aplicar con una lámina de agua baja y dejar reposar el agua hasta que se consuma en la poza. Mantener la humedad en la poza según el tipo de suelo y reponer el agua a la poza 7 días después de la aplicación aproximadamente. Se recomienda usar la dosis alta cuando se tenga un campo con un historial de fuerte presión de malezas. Aplicar máximo 1 vez por campaña/año. En caso la plaga persista, emplear otro plaguicida con diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KILLGRAMIN es compatible con la mayoría de los herbicidas post – emergentes y pre – emergentes de uso común. Evitar los agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

KILLGRAMIN no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (l/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Coquito Verdolaga Moco de pavo Pajilla Lechera	Cyperus rotundus Portulaca oleracea Echinochloa crus-galli Leptochloa unineria Euphorbia hirta	2.5-3.0	110	0.02 (*) 0.1 (**)

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos.

(*) Bensulfuron methyl
(**) Pendimethalin

