

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Sulfonilurea
No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106
CICOTOX: (01) 328-7700
EsSalud: (01) 411-8000 opción 4
INTEROC S.A. 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".


Nostoc®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN

Nicosulfuron 40 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° -SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado 2442. Piso 16
Magdalena del Mar
Lima – Perú
Teléfono: (511) 614 - 5100

Formulado por:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL Co. Ltd.
Nanjing Economic &
Technology Development
Zone, Nanjing - China



Contenido neto : 1L
Número de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NOSTOC® es un herbicida sistémico y actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos impidiendo el crecimiento de la maleza.
Aplicar **NOSTOC®** en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **NOSTOC®** luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

NOSTOC® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha		
Maíz (Zea mays)	Moco de pavo	Echinocloa crus-galli	1.0	60	0.1
	Pata de galina	Eleusine indica			

PC = Período de Carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo vegetativo del cultivo y etapa post emergente de la maleza.

PERIODO DE REINGRESO: Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **NOSTOC®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas. Se recomienda hacer una pre mezcla para evaluar la compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requirir mayor información comuníquese con el titular de registro ó con el distribuidor del producto".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

