SUCCESSOR x 20L 28.7 x 15 cm Ampliación de uso Mandarina: Queresa coma 08.04.21

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **SUCCESSOR® SC** requiere que los operarios que lo manejen y apliquen, usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
-Revise el estado del equipo de aplicación y reemplace los elementos defectuosos. No se exponga, ni respire la neblina y vapores de la aspersión.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- No reutilizar los vestidos y los equipos sin haber sido lavados y revisados previamente; si cualquier parte del cuerpo entra en contacto con el producto, lávela con abundante agua y jabón.
- **SUCCESSOR® SC** No debe almacenarse ni transportarse junto con bebidas, alimentos y drogas. Manténgase bajo control, en su envase original debidamente cerrado.
- Para periodos de almacenamiento cortos se recomienda almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para periodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado a temperaturas menores de 10 °C. Las temperaturas bajas solidifican el producto y lo conservan con toda su calidad.
- Para su uso posterior dele tiempo suficiente para descongelarse y luego agítelo antes de usarlo.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de lo rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIO

OJOS: Lávelos con abundante agua durante 10 a 15 minutos. PIEL: retirar los vestigios contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. INHALACIÓN: Retirese para respirar aire fresco. INGESTIÓN: Busque asistencia médica, no induzca el vomito.

NOTA AL MÉDICO

DL50 oral aguda > 5000 mg/kg peso
DL50 dermal aguda > 5000 mg/kg peso
Antídoto: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: SAMU 106 / FARMAGRO: 614 1500

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SUCCESSOR® sc

Paecilomyces fumosoroseus

ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

AGENTE MICROBIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Composición:

Paecilomyces fumosoroseus, Cepa DSM 15126:
$5x10^{12}$ Conidias viables por litro de formulación 4%
Aditivos 96%

Reg. PBUA Nº 166 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2 Mza. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio
Teléfono: 614 - 1500

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A.
Calle 17 A N° 68 D-38, Bogotá Colombia.

LST Live Systems Technology S.A.

Contenido Neto: **20L**
N° de Lote:
F. Formulación:
F. Vencimiento

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUCCESSOR® SC actúa por contacto con el insecto. Por lo tanto la aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la plaga y hacia las áreas de desplazamiento de esta. Deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia. La aplicación debe tener muy buen cubrimiento, es decir, alto número de microgotas por unidad de área, para aumentar la probabilidad de contagio del insecto.
Preparación de la mezcla: **SUCCESSOR® SC** se usa en dosis de 2 a 5 ml de producto por litro de mezcla de aplicación, según cada caso. Coloque primero parte del volumen de agua y luego agregue el producto en la medida correspondiente a la aplicación que vaya a realizar. Enjuague los recipientes que se hayan untado de producto, vertiendo el enjuague sobre la mezcla a aplicar. Mezcle muy bien. Agregue el agua restante para ajustar la dosis correcta. Agite de nuevo la mezcla total hasta que quede homogénea. Aplique inmediatamente. No guarde mezcla para ser aplicada mas tarde. Agite periódicamente la mezcla durante la aplicación si esta toma mas de media hora. Enjuague el envase para recuperar la totalidad del producto que queda adherido a las paredes del recipiente.
SUCCESSOR® SC En ácaros controla huevos, ninfas y adultos.

DOSIS RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
MANDARINA	Ácaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.35	n.r.	n.r.
	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.30	n.r.	n.r.
PIMIENTO	Ácaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	0.25 - 0.30	n.r.	n.r.
PALTO	Ácaro marrón	*Oligonychus punicae*	0.30 - 0.35	n.r.	n.r.

n.r. = No requiere PC = Periodo de carencia LMR= Límite máximo de residuos

RECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SUCCESSOR® SC debe aplicarse siempre al inicio de la infestación y aparición de primeros estadios de la plaga. Antes de aplicar el producto asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques o canecas de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos cuatro veces con abundante agua.

COMPATIBILIDAD: Consulte la tabla de compatibilidades de **SUCCESSOR® SC** con otros insumos agrícolas con el Departamento Técnico de **FARMAGRO S.A.**
FITOTOXICIDAD: SUCCESSOR® SC no es fitotóxico, ni fitopatógeno a los cultivos recomendados, pero su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE STANSA

PRECAUCIÓN