

SUCCESSOR x 20L 28.7 x 15 cm Ampliación de uso: Vid

15.12.21

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **SUCCESSOR® SC** requiere que los operarios que lo manejen y apliquen, usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos “ligeramente tóxicos” (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Revise el estado del equipo de aplicación y reemplace los elementos defectuosos. No se exponga, ni respire la neblina y vapores de la aspersión.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- No reutilizar los vestidos y los equipos sin haber sido lavados y revisados previamente; si cualquier parte del cuerpo entra en contacto con el producto, lávela con abundante agua y jabón.

- **SUCCESSOR® SC** No debe almacenarse ni transportarse junto con bebidas, alimentos y drogas. Manténgase bajo control, en su envase original debidamente cerrado.
- Para periodos de almacenamiento cortos se recomienda almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para periodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado a temperaturas menores de 10 °C. Las temperaturas bajas solidifican el producto y lo conservan con toda su calidad.
- Para su uso posterior dele tiempo suficiente para descongelarse y luego agítelo antes de usarlo.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: Lávelos con abundante agua durante 10 a 15 minutos. PIEL: retirar los vestigios contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. INHALACIÓN: Retírese para respirar aire fresco. INGESTIÓN: Busque asistencia médica, no induzca el vómito.
- Antídoto: No hay antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



SUCCESSOR® sc

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Paecilomyces fumosoroseus, Cepa DSM 15126:

5x10¹² Conidias viables por litro de formulación 4%
Aditivos 96%

Reg. PBUA N° 166 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mza. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio
Teléfono: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A.

Calle 17 A N° 68 D-38, Bogotá Colombia.



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 20L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: **SUCCESSOR® SC** actúa por contacto con el insecto. Las esporas de *Paecilomyces fumosoroseus* se adhieren a la cutícula de la plaga, germinan y liberan enzimas que facilita su penetración al interior de esta, para luego reproducirse ocasionando un daño fisiológico y posteriormente, la muerte de la plaga. En los ácaros controla los huevos, ninfas y adultos. Por tanto, la aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la plaga y hacia las áreas de desplazamiento de esta. Deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia. La aplicación debe tener muy buen cubrimiento, es decir, alto número de microgotas por unidad de área, para aumentar la probabilidad de contagio del insecto.

Modo de empleo: **SUCCESSOR® SC** se usa en dosis de 2 a 5 ml de producto por litro de mezcla de aplicación, según cada caso. Coloque primero parte del volumen de agua y luego agregue el producto en la medida correspondiente a la aplicación que vaya a realizar. Enjuague los recipientes que se hayan untado de producto, vertiendo el enjuague sobre la mezcla a aplicar. Mezcle muy bien. Agregue el agua restante para ajustar la dosis correcta. Agite de nuevo la mezcla total hasta que quede homogénea. Aplique inmediatamente. No guarde mezcla para ser aplicada más tarde. Agite periódicamente la mezcla durante la aplicación si esta toma más de media hora. Enjuague el envase para recuperar la totalidad del producto que queda adherido a las paredes del recipiente.

“Consulte con un ingeniero agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
MANDARINA	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.35	N.A.	N.A.
	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.30	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.25 - 0.30	N.A.	N.A.
	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.30 - 0.35	N.A.	N.A.
PALTO	Queresa del palto	<i>Florinia florinae</i>	0.35	N.A.	N.A.
ARÁNDANO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.30	N.A.	N.A.
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.30 - 0.35	N.A.	N.A.

N.A. = No aplica

PC = Período de carencia

LMR= Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SUCCESSOR® SC debe aplicarse siempre al inicio de la infestación y aparición de los primeros estadios de la plaga. En los cultivos de mandarina, pimiento, palto, arándano y vid, se realiza una aplicación de **SUCCESSOR® SC** por campaña y una vez al año.

PERIODO DE REINGRESO

No presenta restricciones sobre el periodo de reingreso a las áreas aplicadas.

COMPATIBILIDAD

Consulte la tabla de compatibilidades de **SUCCESSOR® SC** con otros insumos agrícolas con el Departamento Técnico de FARMAGRO S.A.

FITOTOXICIDAD

SUCCESSOR® SC no es fitotóxico, ni fitopatógeno a los cultivos recomendados, pero su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar el “efecto lupa” sobre las hojas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.



PRECAUCIÓN

