

9 cm

"LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Clofedyn[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

9 cm

Abrir
aquí

PANTONE YELLOW C


PANTONE Process Black PC

Pantone bBLACK 6 C


9 cm

- **Grupo químico:** Neonicotinoide (Clothianidin) y Pyrazolecarboxamide (Tolfenpyrad)
- **Registro:** PQUA N° 2795-SENASA
- **Nombre común:** Clothianidin y Tolfenpyrad
- **Nombre químico:** Clothianidin: (E)-1-(2-cloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine; Tolfenpyrad: 4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-toloxyl)benzyl]pyrazole-5-carboxamide
- **Fórmula empírica:** Clothianidin: C₆H₈ClN₅O₂S; Tolfenpyrad: C₂₁H₂₂ClN₃O₂
- **Peso molecular:** Clothianidin: 249.7; Tolfenpyrad: 383.88

Clothianidin:



Tolfenpyrad:



9 cm

Propiedades físicas y químicas:

- **Aspecto:** Líquido
- **Olor:** suave a característico.
- **Dispersibilidad:** 95% min
- **Suspensibilidad:** 90% min
- **Granulometría:** 95% min (malla 200)
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Capacidad y clase de los envases:** 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L y 200 L
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401 - La Molina, Lima
- **Formulado y Distribuido por:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401 - La Molina, Lima

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.

9 cm

- **Color:** Blanco a ligeramente crema
- **pH (1%):** 5-8
- **Persistencia de espuma:** 60 ml máximo
- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **Propiedades oxidantes:** No oxidante

- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide (Clothianidin) y Pyrazolecarboxamide (Tolfenpyrad)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: (01) 328-7700;
CISPROQUIM: 0800-50847



9 cm

4.5 cm

HOJA INFORMATIVA_RETIRA 36 X 4.5 CM

9 cm

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
- "No aplicar en época de floración del cultivo".
- "No aplicar en presencia de polinizadores".
- "No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
- "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes". "Evitar la deriva por el viento".
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".

9 cm

PANTONE YELLOW C

PANTONE Process Black PC

Pantone bBLACK 6 C

9 cm

"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
 "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
 "No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo".
 "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

CLOFEDYN es un insecticida con acción sistémica, translaminar que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la respiración del insecto plaga, ocasionando la supresión de la movilidad y causando la muerte de éste. **CLOFEDYN** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.30 - 0.40	45	(a) 0.01 (b) 0.01

P.C: Período de carencia
 L.M.R: Límite máximo de residuos

(a) Clothianidin
 (b) Tolfenpyrad.

9 cm

9 cm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar CLOFEDYN en etapa de brotamiento del cultivo y al inicio de la infestación de la plaga, máximo dos aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año. Se recomienda la rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

CLOFEDYN No es fitotóxico en el cultivo indicado a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

9 cm

9 cm



9 cm