

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
MAYO DEL 2025
AG

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Clofedyn®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Clothianidin 250.0 g/L
Tolfenpyrad 150.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°2795 - SENASA
Titular de registro:
MONTANA S.A.
Formulado y distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina

Contenido neto: 5 L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
MAYO DEL 2025
AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Este producto es dañino. No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
• Evite el contacto con la piel y la ropa.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
• Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
• Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Neonicotinoide (Clothianidin) y Pyrazolecarboxamide (Tolfenpyrad).
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU:106 / MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Tóxico para abejas y artrópodos beneficios. • No aplicar en época de floración del cultivo. • No aplicar en presencia de polinizadores. • No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. • Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. • Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto,

para el confinamiento de las abejas. • Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. • Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. • En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CLOFEDYN es un insecticida con acción sistémica, transaminar que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la respiración del insecto plaga, ocasionando la supresión de la movilidad y causando la muerte de éste.

CLOFEDYN se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar CLOFEDYN en la etapa de brotamiento del cultivo y al inicio de la infestación de la plaga. En el cultivo de espárrago se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año. En el cultivo de pimiento y arroz se recomienda una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año. En el cultivo de vid, se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. Se recomienda la rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.30-0.40	45	0.01 */ 0.01 **
Pimiento	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25-0.30	3	0.8 */ 1.5 **
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15-0.20	7	0.6 */ 2.0 **
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.20-0.30	90	0.5 */ 0.01 **

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

* Clothianidin / ** Tolfenpyrad

