

10.0 x 14.5 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN**

Azoxystrobin..... 62.5 g/Kg  
*Bacillus subtilis*..... 100 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p.1 Kg

**Registro PQUA N° 2818 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -  
Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:**

**JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD.**

403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China  
Teléfono: 086-531-58897128

**IMPORTADOR:**

**AGRYNOVA S.A.C.**

Av. Manuel Villarán 357 Dpto.102 Urb. La Aurora, Miraflores, Lima - Perú  
Teléfono: +51 (01) 2663828, Nextel: 831\*5780 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

**DISTRIBUIDOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita,  
Perú . Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
**Contenido Neto : 50 g**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

10.0 x 14.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE  
USO Y APLICACIÓN**

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Puede producir lagrimeo, irritación en los ojos.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa de protección cuando se manipule y/o aplique el producto.
- Reingresar al área o cultivos tratados después de 24 horas de ser aplicado el plaguicida.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de inhalación: Mover al afectado a un ambiente fresco con abundante aire. Mantenerlo en reposo, aplicar respiración artificial si la víctima no está respirando. Si hay vómito o plaguicida en la boca o cara de la víctima, evite el contacto directo y use un respirador en forma de tubo cuando sea posible para la respiración boca a boca.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua corriente por lo menos 20 minutos, aplicando luego jabón neutro sin frotar las zonas afectadas.
- En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico y enseñarle la etiqueta.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO:  
+51 (01) 2663828

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo  | Nombre científico    | Nombre común            | Plagas                | Dosis             |           | PC | LMR   |
|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----|-------|
|          |                      |                         |                       | Nombre científico | Kg/200L   |    |       |
| Arroz    | Oryza sativa         | Anublo bacitelal        | Burholideria glumae   | 0.5               | 1.0       | 28 | 5.00  |
| Granado  | Punica granatum      | Mancha negra de la hoja | Alternaria alternata  | 0.4 - 0.5         | 1.2 - 2.0 | 9  | 0.01  |
| Vid      | Vitis vinifera       | Oidiosis                | Erysiphe necator      | 0.4 - 0.5         | 1.2 - 2.5 | 7  | 2.00  |
| Mango    | Mangifera indica     | Oidiosis                | Oidium mangiferae     | 0.5               | 2.0       | 2  | 0.7   |
| Arándano | Vaccinium corymbosum | Cabeza de clavo         | Alternaria tenuissima | 0.4 - 0.5         | 0.8 - 1.0 | 0  | 5.0   |
| Fresa    | Fragaria x ananassa  | Podredumbre gris        | Borythia cinerea      | 0.4               | 0.5 - 0.6 | 0  | 10.0* |

\*Azoxystrobin  
\*\*Bacillus subtilis

PC: Periodo de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

