Etiqueta TOQUI 100 g 17-02-22

Medidas: 9.8 cm (ancho) x 9.6 cm (alto)

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TOQUI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Trifloxystrobin ..... 250 g/kg
Tebuconazole ..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2350 SENASA

Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L
Jirón Luis N. Sáenz 348 Int. 101 - Jesús María – Lima
Teléfono: 920534766

Formulador:

JINGBO AGROCHEMICALS

JINGBO AGROCHEMICALS TECHNOLOGY CO., LTD.
Economic Development Zone,Boxing
County, Shandong Province, China
Tel. +0086-543-2510786.
Fax. +0086-543-2510096-865.

Distribuidor:

hortus

HORTUS S.A.
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041 - Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
www.hortus.com.pe

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 100 g.
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Medidas: 9.8 cm (ancho) x 9.6 cm (alto)

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al centro medico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Teléf. del titular: 920534766

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.3-0.375	14	*3.0 **6.0
	Podredumbre gris / Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.375		
Alcachofa	Oidium	*Leveillula taurica*	0.3	30	*1.0 **0.6
Ají Páprika	Oidium	*Leveillula taurica*	0.250	3	*0.4 **0.6

P.C.: Periodo de carencia (días) **L.M.R.:** Límite máximo de residuos (ppm)

* Trifloxystrobin; ** Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para la aplicación de **TOQUI** el suelo debe estar en capacidad de campo. La planta debe estar turgente. No debe haber humedad sobre la lámina foliar.

Para el cultivo de Vid aplicar **TOQUI** máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña por año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y cultivo.

Para el cultivo de Alcachofa y Páprika aplicar **TOQUI** máximo 1 vez por campaña considerando 1 campaña por año. Dirigir las aplicaciones directamente a las hojas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA