# SUSTENTO RAIZ®

# REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

# **CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

## **COMPOSICIÓN:**

Citoquinina (Zeatin)	 0.132 g/L
Auxina (Ácido indol 3 butírico)	•
Aditivos	•

# Reg. RCP Nº 089 - SENASA



₹itular del registro: POINT ANDINA S.A. Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B. Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfonos: 3481018 / 3499609

Formulado por:

**POINT AGRO-CHINA Ltd** 

Rm 1206 Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu-China

Contenido Neto: 4L

Lote N°:

Fecha de Formulación. Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## 10

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• Evite el contacto con la piel y ojos. • Este producto es nocivo si se ingiere. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

 Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. • Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Utilice equipo de protección personal, como overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla y gafas de seguridad. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

• Contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos levantando los párpados. No se debe esperar ninguna lesión. si se produce irritación busque atención médica.

 Contacto con la piel: Quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos.

• Ingestión: no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.

 Inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente y a la sombra.

No tiene antídoto específico. Tratar según síntomas.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106; POINT ANDINA S.A: (01) 348- 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

#### **CONDICIONES DE MANEJO Y DE** DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este 🔀 fin. • Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

 En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designado ppor las autoridades locales para este fin.

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos destanques.

No permita animales en el área tratada.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: SUSTENTO BAIZ es un regulador de crecimiento a base de auxinas y citoquininas naturales, es un enraizante que promueve la emisión de nuevas raices (absorbentes y pivotantes). Se recomienda aplicar el producto a nivel de cuello de planta (drench o sistema de riego) con la finalidad de asegurar una buena cobertura del área radicular. Las auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias así también como la formación de frutos, las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular. Preparación de la mezcla: Se llena la mochila de aplicación con la mitad del agua a emplear. En un recipiente aparte, se realiza la mezcla del producto y se remueve hasta conseguir una solución homogénea, se vierte al tanque y se completa el nivel de agua a usar en la aplicación, manteniendo la mezcla en agitación constante. No excede las dosis recomendadas en esta etiqueta en una sola aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Vid: Se recomienda realizar de 2 a 3 aplicaciones por campaña, al inicio de campaña, prefloración y cuajado de frutos, con intervalo entre aplicaciones de 10 a 20 días.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la

COMPATIBILIDAD: SUSTENTO RAIZ es compatible con la mayoría de los plaguicidas y sustancias afines. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla en el tanque.

FITOTOXICIDAD: SUSTENTO RAIZ no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## NSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	USO		DOSIS (L/ha)	PC	LMR
	OBJETIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN		(días)	(ppm)
Vid	Enraizante	Inicio de campaña, prefloración y cuajado de frutos.	3	N.A.	N.A.

PC Período de carencia en días.

MR: Límite máximo de residuos (partes por millón).

N.A.: No aplica.





























