

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

LARBEN 50 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES – SG

Composición:

Emamectin benzoato.....50 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectina semisintética
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia por 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos

INFOSALUD: 113 / CICOTOX: (01) 328-7700 / EsSalud: (01) 411-8000 opción 4
ANTALIEN SAC: 946279994

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Aplicar siguiendo la dirección del viento.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LARBEN 50 SG es un insecticida de acción traslaminar, cuyo ingrediente activo actúa a nivel del sistema nervioso central, interfiriendo la acción del GABA, causando parálisis y muerte del insecto.

LARBEN 50 SG se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar el follaje. Gasto de agua considerado: 2,5 a 3,7 cilindros por hectárea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0,2	30	0,01

LMR: Límites Máximos de Residuos / PC: Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación, cuando se observen los primeros estadios de la plaga.
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña. Considerando 2 campañas al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

COMPATIBILIDAD: El producto formulado es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fito tóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Registro PQUA N° xxx- SENASA

Titular del registro: **ANTALIEN SAC**

Formulado por:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

Importado y distribuido por:

Antalien SAC

Av. Las Gaviotas N° 160, Dpto. A706, Urbanización La Campiña Zona
Dos - Chorrillos - Lima - Lima Teléfono: +51 946 279 994

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO



Antalien

Calidad para la Agricultura

F. de form:

N° Lote:

Contenido neto: **25 Kg**

F. de venc:

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

