

18,00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LUFERON 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Lufenuron50 g/L

Aditivos.....csp 1 L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoyl ureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vomito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar fresco. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

SAMU: 106 / ANTALIEN SAC: 946279994

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática altas..

Títular del Registro: ANTALIEN SAC

Formulador:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

Importado y distribuido por:

Antalien SAC

Av. Las Gaviotas N° 160, Dpto. A706, Urbanización La Campiña
Zona Dos - Chorrillos - Lima - Lima, Teléfono: +51 946 279 994

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LUFERON 50 EC es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, que actúa mayormente por ingestión, las larvas son incapaces de mudar, y también dejan de alimentarse.

LUFERON 50 EC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Para la preparación verter la dosis a usar de LUFERON 50 EC en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/200 L		
Espárrago	Copitarsia corruda	<i>Copitarsia corruda</i>	0,2	-	7	0,02
	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0,2 - 0,25		
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0,200		
Páprika	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0,4	-	7	1
	Gusano del fruto	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	0,2		

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña en el cultivo de paprika (1 campaña/año) y 1 aplicación/campaña en espárrago (2 campañas/año) . El momento de aplicación es cuando se empiece a registrar la presencia de la plaga (brotación) y/o cuando se empiece a observar los primeros síntomas de raspado de tallos.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: LUFERON 50 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Reg. PQUA N° XXX - SENASA



N° Lote:

F. de Form:

Contenido Neto: 10 L

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



18,00 cm