

20,00 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice el manipuleo y la aplicación utilizando los equipos de protección recomendados como guantes y botas de goma, pantalones largos, mandil y mascarilla.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

SAMU: 106 - CHEMICAL SELVA: 942 914 218

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No enterrar los envases ni los desechos del producto en el suelo.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## PRIMITIVO 25 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - EW

#### Composición:

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2780 - SENASA

Titular del registro: **CHEMICAL SELVA SAC**

#### Formulador:

**Sinochem Ningbo LTD.**  
21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000. China

#### Importado y distribuido por:

**CHEMICAL SELVA SAC**  
Calle Fernando Belaunde Terry Km. 699. San Martín.  
Email: [gerencia@isteresita.com](mailto:gerencia@isteresita.com)  
Teléfono: 942 914 218



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **200 L**

F. de venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PRIMITIVO 25 EW** es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción protectora, curativa y erradicante.

**PRIMITIVO 25 EW** se absorbe rápidamente por las partes vegetativas de la planta con traslocación principalmente acropétala a toda la superficie de las hojas y frutos.

**PRIMITIVO 25 EW** actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol fungoso por demetilación. Su actividad fungitóxica es sobre la demetilación de los carbonos C14 y C4. Esta acción causa pérdidas de los constituyentes citoplásmicos esenciales.

Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la suspensión uniforme de **PRIMITIVO 25 EW** preparada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo   | Plaga            |                               | Dosis |         | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha  | L/200 L |           |           |
| Espárrago | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0,5   |         | 14        | 0,05      |
|           | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> |       | 0,2     | 21        | 0,02      |
|           | Cercosporiasis   | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,55  |         | n.a       | 0,02      |
| Páprika   | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     |       | 0,2     | 7         | 0,6       |
| Vid       | Oidiosis         | <i>Erysiphe necator</i>       |       | 0,1     |           |           |
|           | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       |       | 0,2     | 14        | 0,5       |
| Alcachofa | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0,4   |         | 7         | 0,6       |

PC: Período de Carenia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo entre aplicaciones debe ser de 9 a 15 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y siempre y cuando continúen las condiciones favorables para el desarrollo de ésta.


**PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD: PRIMITIVO 25 EW** es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

18,00 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

