

COLOR BAND: PANTONE PMS101-C

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

LARVERO[®]

15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 50 g/kg
Lambda-cyhalothrin..... 100 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 -1 - 222-2795

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importador y Distribuidor:
CROPS PROTECTION S.A.C.
Mz. F Lote 21 - Calle Micaela Bastidas -
Alto Mochica - Trujillo - La Libertad - Peru.
Teléfono: + 51 - 44 - 201643



N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 200 G

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- "Este producto es DAÑINO. No ingerir"
- "Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o nebulización)"
- "Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación"
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"
- "Después de usar el contenido, desestruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin"
- "Tóxico para abejas y otros organismos benéficos"
- "Peligroso para organismos acuáticos"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.:(01) 222 - 2795

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Esparrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	5	*0.02 **0.01

PC: Periodo de carencia (días)

* Emamectin benzoate

LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

**Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción

