

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# LARVERO

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

### COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	50 g/kg
Lambda-cyhalothrin	100 g/kg
Aditivos c	s.p. 1 kg

#### Reg. PQUA Nº 2850 - SENASA

Titular de Registro: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú. Teléfono: + 51 -1 - 222-2795

Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China. Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

Importador y Distribuidor: CROPS PROTECTION S.A.C.

Mz. F Lote 21 - Calle Micaela Bastidas -Alto Mochica - Trujillo - La Libertad - Peru. Teléfono: +51 - 44 - 201643

Nº de Lote: Fecha de Formulación:

NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 200 G

NO EXPLOSIVO





## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATI ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIVOS"

"Este producto es DAÑINO, No ingerir"

"Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, ya

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo de hisratian y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la en camon"

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta via ribua informativa adjunta"

"Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autorizade llo al es para este fin"

"Tóxico para abejas y artropod s benéficos"

"Peligroso para organismos acuáticos"

# LÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106** 

OS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.:(01) 222 - 2795

## Consulte con un ingeniero agrónomo

	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	kg/200L	(diás)	(ppm)
Esparrago (Asparagus officinalis)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento (Capsicum annuum)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1	5	*0.02 **0.01

PC: Periodo de carencia (días) \*Emamectin benzoate

LMR: Límite máximo de residuos (ppm) \*\*Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción







