

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

LARVERO®

15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	50 g/kg
Lambda-cyhalothrin	100 g/kg
Aditivos	.s.p. 1 ka

Reg. PQUA N° 2850 - SENASA

Titular de registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfono: + 51 -1 - 222-2795

Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, Nº 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: +86 - 574 - 87301088

Importador y Distribuidor: CROPS PROTECTION S.A.C.

Mz. F Lote 21 - Calle Micaela Bastidas -Alto Mochica - Trujillo - La Libertad - P Teléfono: + 51 - 44 - 201643

Nº de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de vencimiento

NO INFLAMABLE

Contenido neto: 1 KG

NO EXPLOSIVO





"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (polyo, vapor o aspersión).
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas
- bebidas, ni forraies. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
- área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese
- con abundante agua y jabón. Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del vie

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXIL

- Grupo Químico: Derivado de micoorganismos y No existe antidoto específico. Tratago
- En caso de intoxicación, llamé al r al centro médico y mostrar etil
- sin supervisión médica. No administrar nada na está inconsciente o padece
- el, retirar la ropa y calzado contaminado agua y jabón.
- on los ojos, lavarlos con abundante agua por lo inutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- inhalación retirar a la nersona del área contaminada a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

convulsione

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.:(01) 222 - 2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE **DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- -No aplicar en época de floración del cultivo
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos - Anlicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas,
- Peligroso para organismos acuáticos.
- -No contaminar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir
- animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJ

LARVERO* 15 WP es un inseracida c ingredientes activos Emameo cyhalothringue actúan p

s, calcular la cantidad de agua a ue de mezda la mitad del agua uego se adiciona la cantidad del ad LAR (ERO* 15 WP de acuerdo a la dosis lad luego se acita la mezcla; finalmente se resto de agua y se procede a la aplicación del

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre Clentifico	kg/200L	PC (diás)	(ppm)
Esparrago (Asparagus officinalis)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento (Capsicum annuum)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1	5	*0.02

PC: Periodo de carencia (dias)

LMR-Limite máximo de residuos (nom)

Emamectin benzoate / ** Lambda-cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Anticar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase. corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

























