

SECULIOR 38 WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin.....	128 g/kg
Boscalid.....	252 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° SENASA

Grupo químico: Strobilurin (Pyraclostrobin) + Pyridinecarboxamide (Boscalid)

Nombre químico:


Pyraclostrobin: Methyl (2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxyethyl)phenyl(methoxy)carbamate
Boscalid: 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

Fórmula química: Pyraclostrobin: C₁₉H₁₆ClN₃O₄ Boscalid: C₁₈H₁₀ClNO


Peso molecular: 387.82 g/mol / 343.21 g/mol respectivamente

Fórmula estructural:

Pyraclostrobin:



Boscalid:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 780 g/l a 20°C
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

500g y 1kg

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.
Calle Pucallá 324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico,
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 983275666

Formulado por:



青島聯合利農植保技術有限公司

Qingdao Agro-unitek Cropscience Co., Ltd.

Add: Room 304, Hui'er road No.67, Qingdao City, Shandong, China
Tel: +86 532 80995916 Fax: +86 532 80995916

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

SAMU: 106

Teléfono del titular de registro:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.: 983275666

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobilurin (Pyraclostrobin) + Pyridinecarboxamide (Boscalid)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Lavar antes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante la preparación de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SECULIOR 38 WDG, fungicida sistémico, transmite con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar, puede destruir selectivamente el micelio del hongo durante su periodo de incubación impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.

SECULIOR 38 WDG se prepara diluyendo la dosis indicada en recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar SECULIOR 38 WDG con una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (Alta humedad relativa).
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SECULIOR 38 WDG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/cu	Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidiois	Erysiphe necator	0.12 - 0.16	0.50-0.65	14	2.00 ¹ 5.00 ²

PC: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos
¹Pyraclostrobin ²Boscalid

