

27.5 cm

14.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un ambiente seco ventilado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico : Triazina.**
- En caso de intoxicación oral, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Acudir al médico si hay intoxicación dermal.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
POINT ANDINA SA: (01) 348-1018

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para aves.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicar hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En el caso de derrame, no recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

BASTÓN®

480 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Metribuzin.....480 g/L
Aditivos c.s.p. 1%

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima, Perú.
Tel: (01) 348-1018

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LIMITED
Wan Shi Town,
Yixing Jiansu 214217, China

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: BASTÓN 480 SC es un herbicida sistemático, pre y post emergente al cultivo perteneciente al grupo de triazinas, selectivo para cultivos de hojas angostas y anchas. BASTÓN 480 SC es absorbido por las hojas y raíces, su efecto aparece sobre el follaje rápidamente y obstaculiza la fotosíntesis. Se acumula en los meristemos (puntos de crecimiento). BASTÓN 480 SC se emplea diluido en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. BASTÓN 480 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional al terrestre (nebulizadores, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la presencia de malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/cil 200 L	L/ha		
Espárrago	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	120-180	0.2-0.3	14	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Papa	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crus-galli</i>				
Tomate	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	200	0.2	50	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				
	"Yuyo"	<i>Amaranthus sp.</i>				
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
Zanahoria	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	-	0.4	60	0.1
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>				
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar 1 aplicación / campaña teniendo en cuenta 2 campañas/año
- Se recomienda hacer la aplicación pre emergente al cultivo y a la maleza o de lo contrario aplicar antes de realizar el trasplante. Las aplicaciones post emergentes, deben ser temprano al cultivo y a la maleza (plantas no mayores de 10cm de altura y antes del macollamiento).

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar BASTÓN 480SC solo, sin mezcla con ningún otro pesticida.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

