

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un ambiente seco ventilado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico : Triazina.**
- En caso de intoxicación oral, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Acudir al médico si hay intoxicación dermal.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para aves.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicar hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En el caso de derrame, no recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# BASTÓN®

## 480 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Metribuzin..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2857- SENASA

Titular de Registro, Importador y  
Distribuidor: INSUMOS AGRÍCOLAS  
PERUANOS S.A.C.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: POINT INTERNATIONAL LTD.  
42 St. Margarets Grove  
Twickenham TW1 1JG  
United Kingdom

Contenido Neto: 200L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BASTÓN 480 SC** es un herbicida sistemático, pre y post emergente al cultivo perteneciente al grupo de triazinas, selectivo para cultivos de hojas angostas y anchas. **BASTÓN 480 SC** es absorbido por las hojas y raíces, su efecto aparece sobre el follaje rápidamente y obstaculiza la fotosíntesis. Se acumula en los meristemas (puntos de crecimiento).

**BASTÓN 480 SC** se emplea diluido en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. **BASTÓN 480 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la presencia de malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | MALEZAS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | DOSIS    |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN                                                                                                                                       | NOMBRE CIENTÍFICO                                                                                                                                                                            | ml/200 L | L/ha    |              |              |
| Espárrago | Verdolaga<br>Yuyo                                                                                                                                  | Portulaca oleracea<br>Amaranthus hybridus                                                                                                                                                    | 120-180  | 0.2-0.3 | 14           | 0.05         |
| Papa      | Capulí cimarrón<br>Chamico<br>Hierba del gallinazo<br>Lechera<br>Lengua de vaca<br>Moco de pavo<br>Pata de gallina<br>Rabo de zorro<br>Yuyo hembra | Nicandra physalodes<br>Datura stramonium<br>Chenopodium murale<br>Euphorbia hirta<br>Rumex crispus<br>Echinochloa crus-galli<br>Eleusine indica<br>Setaria parviflora<br>Amaranthus hybridus | 300-400  | 0.3-0.4 | 42           | 0.05         |
| Tomate    | Cadillo<br>Leptochloa<br>Pata de gallina<br>Verdolaga<br>Yuyo<br>Hierba de gallinazo                                                               | Cenchrus sp.<br>Leptochloa univervia<br>Eleusine indica<br>Portulaca oleracea<br>Amaranthus sp.<br>Chenopodium murale                                                                        | 200      | 0.2     | 50           | 0.1          |
| Zanahoria | Amor seco<br>Lechera<br>Verdolaga<br>Chamico<br>Pata de gallina                                                                                    | Bidens pilosa<br>Euphorbia hirta<br>Portulaca oleracea<br>Eleusine indica<br>Datura stramonium                                                                                               | -        | 0.4     | 60           | 0.1          |

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar 1 aplicación /campaña teniendo en cuenta 2 campañas/año. Se recomienda hacer la aplicación pre emergente al cultivo y a la maleza o de lo contrario aplicar antes de realizar el transplante. Las aplicaciones post emergentes, deben ser tempranas al cultivo y a la maleza (plantas no mayores de 10cm de altura y antes del micollamiento).

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD:** Se recomienda aplicar **BASTÓN 480 SC** solo, sin mezcla con ningún otro pesticida.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

