

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PEON® 100 EC esta formulado por el ingrediente activo Alpha-cypermethrin, que es un insecticida no sistémico, actúa por contacto e ingestión (acción estomacal). Es un modulador de los canales de sodio interrumpiendo la transmisión normal de los impulsos nerviosos.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	180	0.4
Palto (<i>Persea americana</i>)	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.25	7	0.05

LMR.: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **PEON® 100 EC** cuando observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas por año para Espárrago, y máximo 2 aplicaciones por campaña y una campaña al año para el cultivo de palto.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Evite mezclar **PEON® 100 EC** con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PEON®
100 EC

AGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirlos 239, Lince, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 00 51-1-222-2795 / 00 51-1-441-1857

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importador y Distribuidor:
PERU FERTIL E.I.R.L.
Jr. Neon N° 5681 Zona Industrial Infantes,
Los Olivos - Lima - Perú
Teléfono: + 51 - 949 - 845 - 833

N° de lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**




“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Nombre comercial del producto:
PEON® 100 EC
Clase: **Insecticida Agrícola**
Reg PQUA N°: - SENASA

Composición Química:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica: $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Peso Molecular: 416.30 g/mol
Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 100 ml, 250 ml, 500 ml

Propiedades físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: Amarillo claro a marrón

Olor: Característico.

Densidad: 0.95 ± 0.05 g/mL

pH: 4.0-4.7

Persistencia a la espuma: 18 mL después de 1 min

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Estable bajo condiciones normales durante dos años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Pesticidas.
- En caso de intoxicación, llévelo al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico más cercano.
- En caso de ingestión, inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **ANTÍDOTO:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: 511 222 2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el envase, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación o en el triturador, triturándolo o perforándolo.
- Entregue o acopie el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
 - Peligroso para abejas y para artrópodos benéficos.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No aplicar en época de floración del cultivo.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
 - No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

