

MEDIDAS ETIQUETA: 20.5 X 28 CM
9 de Diciembre del 2021
AG

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Cadena®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Boscalid 500 g/kg
Aditivos..... csp1 kg

Reg. PQUA N° 2861-SENASA
Titular del registro:
MONTANA S.A.

Formulado por: JINGBO AGROCHEMICALS
TECHNOLOGY CO., LTD
Economic Development Zone, Boxing County,
Shandong Province, China.

Importado y distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado 6210 Oficina 401.
La Molina, Lima-Perú
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
SAMU: 106

Contenido Neto: 25 kg.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamida (Boscalid).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar de beber agua ni administrar nada a una persona inconsciente. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico.
- En caso del contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste.
- En caso del contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante jabón y agua mientras se quita la ropa contaminada. Continúe por lo menos durante 15 minutos. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- CADENA es un fungicida con actividad sistémica local, con efecto preventivo y curativo. Su ingrediente activo Boscalid actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además, regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera CADENA actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo de los hongos; inhibiendo la germinación de esporas, el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación y el desarrollo del micelio del hongo.
- CADENA se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- CADENA puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Vid	Podredumbre gris / Moho gris	Botrytis cinerea	-	1.2-1.4*	7	5.0
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.25 - 0.3	-	1	10

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos *Volumen de agua: 1000 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva durante el periodo de mayor susceptibilidad del cultivo al ataque del hongo, preferiblemente a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, asegurando un buen cubrimiento de los racimos.
- En vid realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, a un intervalo de aplicación de 10 días, considerando una campaña al año.
- En arándano realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, a un intervalo de aplicación de 30 días, considerando una campaña al año. Aplicar durante la floración del cultivo.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CADENA es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.