

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese, cambíese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurín - Triazole
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico, muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU-106  
CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.: 044-407781

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación en los cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. Mantenga a los animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas precautorias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los silos destinados por las autoridades locales para este fin.

# EMPERADOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Azoxystrobin.....	250 g/L
Difenoconazole.....	250 g/L
Aditivos.....	c.s.p 1L

REG. PQUA N°2139 - SENASA

Titular del Registro:  
**CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC**  
Calle B, N° 141, km. 202  
Pro 9no sector, San Martín de Porres  
Teléfono: 044 407781

#### Formulado por:

**NANJING RHONQUIM CO. LTD.**  
No.26 Majia street,  
Nanjing 210009 China  
Teléfono: +86 25 52621629  
Fax: +86 25 83303203

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:

**Green Valley**  
CORPORACIÓN GREEN VALLEYSAC  
RUC: 20492612767  
www.greenvalley.com

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EMPERADOR es un fungicida sistémico y de contacto, actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente a la muerte del hongo.

EMPERADOR se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, prevaleciendo con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
UVA	"Oldiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	14	2' 3'

L.M.R. = Límite máximo de residuos

1 Azoxystrobin  
2 Difenoconazole

PC = periodo de carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesario una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 h después de la aplicación. Mantener atado al ganado durante este periodo.

#### COMPATIBILIDAD

EMPERADOR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

EMPERADOR no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7.3



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

