

“LEACUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide + Mimético de la Hormona Juvenil.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAMU 106 ; Adama Agriculture Perú S.A. : (01)641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



# Trivor<sup>®</sup> 310 DC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO DISPERSABLE (DC)

Composición:  
Acetamiprid..... 186 g/L  
Pyriproxyfen ..... 124 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2864-SENASA

Titular del Registro:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of. 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V.**  
**Sucursal Colombia**  
Calle 10 N° 753  
Interior Zona Franca.  
Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:

**TALEX PERU S.A.C.**  
Calle René Descartes N°311  
Urb. Santa Raquel 2da etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf: 612-6565  
RUC: 20513013826

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Trivor 310 DC** es un insecticida de contacto, traslaminar que actúa por ingestión. Contiene acetamiprid y pyriproxyfen, actúa a nivel del sistema nervioso (agonista del receptor nicotínico) y como mimico de la hormona juvenil. Realizar la aplicación al follaje con equipo de pulverización terrestre (mochila a motor o tractor con pulverizadora de aire a presión) empleando gotas finas y cobertura uniforme. El agua para la aplicación debe tener un pH ligeramente ácido a neutro, con valores de 6 a 7 unidades, además debe estar libre de impurezas y sales.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Arándano	Mosca Blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.1 - 0.15	-	7	2.0*/1.0**
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 - 0.25	-	20	0.8*/2.0**
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.15-0.175	1.4 - 1.6	30	1.0*/0.5**
Pallo	Queresa	<i>Flionia fiorinae</i>	0.175	-	1	0.5*/1.0**
	Mosca blanca	<i>Aleuropleurocelus sp.</i>	0.175	-		
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2	-	21	0.5*/2.5**

P.C.: Periodo de Carenzia; LMR: Límite Máximo de Residuos; \*Acetamiprid, \*\*Pyriproxyfen

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar para espárrago como máximo 2 veces por campaña considerando 2 campañas al año, para los otros cultivos como máximo 1 vez por campaña, considerando 1 campaña por año. En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia. Para mayor información ver hoja informativa. **NO APLICAR EN FLORACIÓN.**

**PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD**

Ver Hoja Informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO

Dimensiones reales : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta va acompañada de Hoja Informativa