

Trivor[®] 310 DC

Composición:	
Acetamiprid	186 g/L
Pyriproxyfen	124 g/L
Aditivos	c.s.p.1L

Titular del Registro,
Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Contenido neto: 5 Litros
Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Cara

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y APLICACIÓN

- No hacer productos de CUIDADO No Ingerir.
- Utilizarse si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- Póngase la ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

- Grupo químico: Neonototinoide + Mimetico de la Hormona Juvenil.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAMU 106 ; Adama Agriculture Perú S.A. : +51 944 222 222

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Trivor 310 DC es un insecticida de contacto, traslaminar que actúa por ingestión. Contiene acetamiprid y pyriproxyfen, actúa a nivel del sistema nervioso (agonista del receptor nicotínico) y como mimico de la hormona juvenil.

Realizar la aplicación al folllaje con equipo de pulverización terrestre (mochila o motor o tractor con pulverizadora de aire a presión) empleando gotas finas y cobertura uniforme.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.15- 0.175	1.4- 1.6	30	1.0* 0.5**
Palto	Queresa	<i>Florinia florinae</i>	0.175	-	1	0.5* 1.0**

PC.: Periodo de Cargencia | MR.: | ímite Máximo de Residuos

*Acetamiprid, **Pyriproxyfen

Máximo una (1) aplicación por campaña. Considerar 1 campaña por año.

- Aplicar previa evaluación, cuando se presenten las primeras infestaciones. En mandarina y palto aplicar cuando se observen como máximo 5 ninfas/adultos por hoja.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- NO APLICAR EN FLORACIÓN.

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

Compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura. No mezclar con plaguicidas de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad física.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta va acompañada de Hoja Informativa