

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

NODOUBT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Cymoxanil	80 g/Kg
Mancozeb	641 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 0000 - SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cianoacetamida oxima. (Cymoxanil). Carbamato (Mancozeb).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos aproximadamente.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- Si es posible, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106, IPEH: (01) 226-7332

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

TITULAR DEL REGISTRO:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS
 Calle 21 Nro 713 Of. 205, San Isidro PERÚ
 Telefax: (511) 2255951- 2267332
 www.ipeh.org.pe

FORMULADOR:

Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd.
 2303# Taihu Avenue, Changxing County Economic Development Park,
 Zhejiang, China. Tel: +86-572-6121387, 6228118

© = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NODOUBT®, es un fungicida sistémico y de contacto. Contiene cymoxanil y mancozeb, por lo que actúa preventiva y curativamente. Actúa inhibiendo la síntesis del RNA y otros procesos metabólicos de los hongos, afectando el desarrollo de los hongos y su esporulación. En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/ha)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
VID	Mildiu	Plasmopara viticola	1.5-2.0	35	0.3 / 1.5

P.C.: Período de carencia / N.D.: No determinado / L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar la dosis menor cuando la presión de plaga sea baja y la dosis mayor cuando la presión de la plaga sea alta.
- Como máximo aplicar 1 vez por campaña, considerando 1 campaña al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- Dosis máxima: 2.0 Kg/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

 **Ipeh**
 Instituto Peruano del Espárrago
 y Hortalizas

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: **20 Kilos**

Fecha de vencimiento:



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

