

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# NODOUBT®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Cymoxanil | 80 g/Kg     |
| Mancozeb  | 641 g/Kg    |
| Aditivos  | c.s.p. 1 Kg |

**Registro PQUA N° 0000 - SENASA**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Cianoacetamida oxima. (Cymoxanil). Carbamato (Mancozeb).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos aproximadamente.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- Si es posible, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106, IPEH: (01) 226-7332

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

**TITULAR DEL REGISTRO:**

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS  
 Calle 21 Nro 713 Of. 205, San Isidro PERÚ  
 Telefax: (511) 2255951- 2267332  
 www.ipeh.org.pe

**FORMULADOR:**

CAC Nantong Chemical Co., Ltd.  
 No.4, Yellow Sea Road, Yangkou Chemical Industry Area, Rudong,  
 Nantong, Jiangsu, China.  
 TEL: 0086-513-68925288 FAX: 0086-513-68925013

© = Marca Registrada por IPEH

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

NODOUBT®, es un fungicida sistémico y de contacto. Contiene cymoxanil y mancozeb, por lo que actúa preventiva y curativamente. Actúa inhibiendo la síntesis del RNA y otros procesos metabólicos de los hongos, afectando el desarrollo de los hongos y su esporulación. En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Plaga        |                     | Dosis (Kg/ha) | P.C. (Días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|
|         | Nombre común | Nombre científico   |               |             |           |
| VID     | Mildiu       | Plasmopara viticola | 1.5-2.0       | 35          | 0.3 / 1.5 |

P.C.: Período de carencia / N.D.: No determinado / L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar la dosis menor cuando la presión de plaga sea baja y la dosis mayor cuando la presión de la plaga sea alta.
- Como máximo aplicar 1 vez por campaña, considerando 1 campaña al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- Dosis máxima: 2.0 Kg/ha.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

 **Ipeh**  
 Instituto Peruano del Espárrago  
 y Hortalizas

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: **25 Kilos**

Fecha de vencimiento:



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

