

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Solo para aplicación foliar.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenil éter
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A. (01) 501-1000. NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

“Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto o desechos de envases vacíos”.
“No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los restos o sobrantes y envases vacíos”.
“Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración”.
“Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros”.
“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.”
“El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.”
“El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
“No aplicar directamente al suelo. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

KORY®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN

Pyriproxyfen..... 100 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2851 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9,
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:
JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
N° 58 Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical
Zone. Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KORY es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro. Actúa suprimiendo la embriogénesis y metamorfosis de varias especies de insectos. Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de KORY agitar y completar el resto con agua. Utilizar equipos de aspersión en perfecto estado y correctamente calibrados para realizar las aplicaciones.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.15 - 0.2	0.75 - 1	14	1.0
Arándano	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.1 - 0.15	0.6 - 0.9	13	0.05

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de **Palto**: Realizar un máximo dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña/año y un gasto de agua promedio de 1000 L/ha; para el cultivo de **Arándano**: Realizar 1 aplicación/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KORY es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

