

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PILARKING 70 WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Imidacloprid700 g/kg
Aditivos:c.s.p. 1 kg

REGISTRO PQUA N° 1521 - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C.
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659



Formulador: PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd.
1500 Hang-tang Road Jin-Hui Town,
Feng-xian District Shanghai, P.R. of China
Tel.: (86-21) 5758-9888



Importador y Distribuidor: PILARBIO PERÚ S.A.C.
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659



Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 100 g

INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

SEGUNDO PDF V01 | Cara Anterior 100g
Producto: Pilarking 70WP País: Perú
Fecha: Junio 12, 2024 Tamaño: 150 x 200 mm

TINTAS (5)
Cian Amarillo Pantone Yellow C
Negro Magenta

CONTROL DE CAMBIOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 PILARBIO PERU SAC: 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARKING 70WP, es un insecticida altamente sistémico elaborado a base de Imidacloprid, ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión. Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente al follaje.

PILARKING 70WP, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/Cil	kg/ha		
VID	Filoxera	Phylloxera vitifoliae	50	0.163	14	1

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **PILARKING 70 WP** (i.a imidacloprid) un máximo de una aplicación por campaña, al observarse los primeros síntomas de la plaga o cuando esté presente un porcentaje donde afecte significativamente la cosecha

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

PILARKING 70 WP, es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



PRIMER PDF	V01 Cara Posterior 100g	TINTAS (2)	CONTROL DE CAMBIOS
Producto: Pilarking 70WP	País: Perú	Negro	
Fecha: Junio 12, 2024	Tamaño: 150 x 200 mm	Pantone Yellow C	