

54.4 cm.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar, el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo , mezcla y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa.
- En caso de ingestión: No dar líquido, no inducir al vómito. No darle nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.

Teléfono de emergencia:

ESSALUD: 0801.10200 (Gratuito), AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

CICOTOX: 0800-13040 (Gratuito)

ANTIDOTO: No existe uno específico. El tratamiento es netamente sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

+Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta

la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo,

tritúrandolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las

autoridades locales para este fin.

+Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

+Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Fabricado y Formulado por:
Ningbo Genetic Chemical Co., Ltd
Room 10-B, Shidai Square, N°8, Lengleng Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China
Teléfono: +86 574 87301088/87302088

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

AMETEC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametryna.....500 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° 1078-SENASA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 4 L

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AMETEC® i es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas. Recomendado para el control pre-emergente y post-emergente temprano temprano de malezas gramíneas, anuales y de hoja ancha.
AMETEC® se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente en pulverizaciones dirigidas a la maleza, con equipos convencionales de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico, en perfecto estado de funcionamiento y previamente calibrados.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.
PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar **AMETEC®** inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.
POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar **AMETEC®** preferentemente después de un riego, cuando las malezas de hoja ancha tengan de 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS(*)	P.C.	L.M.R
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	(días)	(ppm)
MANDARINA	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	2,5 - 4	160	0.01
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>			
	“Rabo de zorro”	<i>Setaria verticillata</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>			

P.C.= Período de carencia/ L.M.R.=Límite máximo de residuos
(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **AMETEC®** (i.a. Ametryna) como máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año en pre-emergencia o postemergencia temprana (no más de 4 hojas).

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina ó ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”



13,3 cm

53.4 cm.

50.2 cm.

1 cm