102,2 cm

13,3 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Este producto es de cuidado. No ingerir.
-Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar, el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Mantenerlo bajo llave y fuera del alcance de niños.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Triazina
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa.
-En caso de ingestión: No dar líquido, no inducir al vómito. No dañe nada por la boca a una persona inconsciente.
-En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos.
-En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua.
-En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.

Teléfono de emergencia:
ESSALUD: 0801 10200 (Gratuito). **AGRO KLINGE S.A:** (01) 641-0000.
CICOTOX: 0800-13040 (Gratuito)
ANTÍDOTO: No existe uno específico. El tratamiento es netamente sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo.
-Entregue el envase inutilizado y contaminado en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Mantener alejado de fuentes de agua, alimentos y forrajes para evitar contaminar del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para animales domético, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

AMETEC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Ametryna.....500 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA Nº 1078-SENASA

Fabricado y Formulado por:
Ningbo Gengchi Chemical Co. Ltd.
Room 10-6, Bridge Square, No. Lanqing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China
Telefono: +86 574 87301088/87302088

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf. (01) 641-0000

Lote Nº:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 20 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **AMETEC®** es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas. Recomendado para el control pre-emergente y post-emergente temprano temprano de malezas gramíneas, anuales y de hoja ancha.
AMETEC® se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del producto. Aplicar uniformemente en pulverizaciones dirigidas a la maleza, con equipos convencionales de aspersión terrestre, provistos de boquillas abanico, en perfecto estado de funcionamiento y previamente calibrados.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha
PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar **AMETEC®** inmediatamente después de la siembra sobre el terreno humedecido.
POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar **AMETEC®** preferentemente después de un riego, cuando las malezas de hoja ancha tengan de 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de uso

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS(*)	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha		
MANDARINA	"Verdolaga" "Moro seco" "Pata de pomo" "Pata de gallina" "Yuyo"	*Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Ipomoea verticilata* *Eleusine indica* *Amaranthus dubius*	2,5 - 4	160	0.01

P.C. = Periodo de carencia / L.M.R.=Limite máximo de residuos
(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **AMETEC®** (i.a. Ametryna) como máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año en pre-emergencia o postemergencia temprana (no más de 4 hojas).

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina ó ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

97 cm

101,2 cm

1 cm