ETIQUETA PARA USO EN EL HUEVO DEL SENASA

11,5 ± 0,3

2,5 ± 0,3

1,9

GIBAGRIN®

Ácido Giberélico 10%
Regulador de crecimiento Vegetal
Tabletas Solubles

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Para este producto ligeramente tóxico, es necesario tener en cuenta para su manipulación las medidas generales de precaución en plaguicidas como:
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o veterinario.
- No comer, no beber ni fumar durante la preparación y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- GIBAGRIN es considerado como un producto ligeramente tóxico. En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir el vomito y acudir al doctor.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 min., si persiste la irritación, acudir al oculista.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Notas al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. TOXICIDAD Aguda Oral >5000mg/kg, Aguda Dermal >2000mg/kg
- Antídoto: No hay antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GIBAGRIN es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce a la floración, disminuye la caída de frutos, regula la maduración de frutos, produce la interrupción de la lactancia de las semillas, tubérculos y bulbos.

Mecanismo de acción:
Promueve el crecimiento y elongación celular mediante la estimulación de las células de las semillas germinantes al producir moléculas de ARN mensajero que codifica las enzimas hidrolíticas.

Llenar el tanque o mochila con el volumen de agua requerida, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **GIBAGRIN**, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día. Si llueve dentro de las 10 horas después de aplicado, su actividad se pierde. los envases vacíos proceder a inutilizarlos y descartarlos de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades.

PERIODO DE REINGRESO: 2 horas después de aplicado

COMPATIBILIDAD: GIBAGRIN es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar productos alcalinos o de soluciones que contengan cloro.

FITOTOXICIDAD: GIBAGRIN no es fitotóxico usado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Dosis		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC. (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Tab x 200 L	Tab x Ha			
Páprika	1 - 2	-	Realizar una aplicación al inicio de fructificación. (Después del cuajado de frutos), por aspersión foliar.	N.D.	N.D.
Papa	2 - 4	-	Para inducir al brotamiento de semilla, sumergir por 3 min. en la mezcla con ayuda de una canastilla y luego escurrir los tubérculos.	N.A.	0.15
Uva de mesa	3 - 4	-	Aplicar cuando los granos de uva tengan entre 4 y 5 mm de diámetro para incrementar su tamaño.	14	0.15
Cítricos (Naranjo)	4	-	Cuando los frutos tengan un promedio de 10 a 14 mm de diámetro.	30	0.15
Mandarina	-	40 - 60	Aplicar en floración y al inicio del cuajado de frutos.	N.A.	N.A.

PC: Periodo decarencia N.A.: No aplicable N.D.: No determinado
LMR: Límite Máximo de Residuos

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

Titular de Registro:
DVA PERU SAC
Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar-Lima
Telefono: 511-6449380 / 953 730 063

Composición:
Ácido Giberélico (GA) ..... 103 g/kg
Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

Importador y Distribuior:
DVA PERU SAC
Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar-Lima
Telefono: 511-6449380 / 953 730 063

Formulador:
ZHEJIANG QIANJIN BIOCHEMICAL CO., LTD
No. 598 Xishan Road, Xiashi, Haining, Zhejiang-China

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: **100g (10 Tabletas)**
Fecha de vencimiento:

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS SOLUBLES (TB)

Reg. PBUA N° 054-SENASA

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PRECAUCIÓN

TEXTO C 0 M 0 Y 0 K 100

L. GIBER PLUS C 11 M 0 Y 90 K 0 — PANTONE 377 C

B. TOXIC C 100 M 0 Y 85 K 24 — PANTONE 348 C

2,5 ± 0,3

13,3 ± 0,3