19,5 ± 0,5

2,0 ± 0,5

2,0 ± 0,5

32,0 ± 0,5

4,5

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mc - Hamer

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Cymoxanil..... 80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 2862 - SENASA

Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A
Z.I. El Agustino. Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9297

SICSAC
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY

Formulado por:
ANHUI FENGLE AGROCHEMICAL CO., LTD.
4 Chuangye Road, Hefei,
P.R. China 230031.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg
Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Toxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Acetamidas + Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, provoquese el vomito, siempre que el paciente este consciente.
- No tiene antídotos específicos.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SICSAC: (01) 644-9297

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MC-HAMER es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple.
MC-HAMER es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta.
MC-HAMER tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD
MC-HAMER se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200L		
PAPA	Rancha o Hielo fungoso	*Phytophthora infestans*	1.5-2.0	0.5	14	a) 0.05 b) 0.3

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
a) Cymoxanil b) Mancozeb

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA