"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SIPERUS 10 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Pyrazosulfuron ethyl.....	**100 g/Kg**
Aditivos.....c.s.p.	**1 Kg**

Registro PQUA No. 2126-SENASA

Titular del Registro: Rotam Agrochemical Perú S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304, Surco
Lima - Perú

Formulado por:
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,
Jiangsu 215301 China.
www.rotam.com

Importado y Distribuído por:
GREEN SOLUTIONS S.A.C.
Jr. Aurelio Miró Quesada 512
Urb. Ingeniería, Lima 31 – Perú
www.greensolutions.pe

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Contenido neto: 200 g
Fecha de Vencimiento:

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicina, bebidas ni forraje.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua, por lo menos por 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por via oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todos los medios necesarios para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SIPERUS 10 WP es un herbicida sistémico. Actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos esenciales, inhibiendo la enzima acethyl lactato sintetasa (ALS) el cual detiene la división celular y deteniene el crecimiento de las malezas provocando su muerte.

SIPERUS 10 WP aspersión foliar terrestre sobre el follaje previa dilución del producto en agua.
Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se realizara una sola aplicación por campaña, en etapa de macollamiento del cultivo y post emergencia de la maleza.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación

COMPATIBILIDAD:
Evite mezclar con agentes fuertemente oxidantes

FITOTOXICIDAD:
No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Coquito	*Cyperus rotundus*	0.2	30	0.1

PC: Periodo de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos