LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambiase, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUIMICO: Cianoacetamida (Cymoxanil) y Ditiocarbamato (Mancozeb).

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua. No provoque el vómito. No dar de beber agua al paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona con aire fresco. Aplicar respiración artificia si la respiración desciende o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0 800 - 1- 3040 /328-7700
ESSalud en línea (gratuita): 0801-10200 / 411- 8000 opción 4

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No botar en fuentes de agua, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios.
- No aplicar en época da floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MATA-RANCHA es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos Mancozeb (fungicida de contacto) y Cymoxanil (fungicida sistémico), se utiliza de manera preventiva, curativa y en pos-infección, además es erradicante.

Preparación:

Hacer una mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

MATA-RANCHA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba *en* una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

MATA-RANCHA no es Toxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg /200 L	Kg/ha		Cymoxanil	Mancozed
CEBOLLA	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5	-	7	0.5	1.0
PAPA	Hielo o Rancha	*Phytophthora infestans*	0.5 – 0.75	-	15	0.5	0.3
QUINUA	Mildiú	*Peronospora farinosa*	0.5	-	25	0.05	0.05
VID	Mildiú	*Plasmopara viticola*	-	2	10	5	5

*** LMR:** Límite Máximo de Residuos ***PC:** Periodo de Carencia *n.d.: no determinado

CURA-RANCHA

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil ..... 80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos c.s.p1kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:
Andrey Liadine Herrera
Dirección: Calle Venus 939
Lima - Perú

Fabricado y Formulado por:
NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.
A-307 Wanda Center, No.102
Mid Jiangdong Rd., Nanjing, China 210019

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de. Vencimiento:

Contenido Neto: 1 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO