



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE ( WP)

COMPOSICIÓN:

- Cymoxanil.....80 gr/kg
Mancozeb.....640 gr/kg
Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° 2210- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: NUTRITEC COMPANI S.A.C

Calle Felipe Santiago Crespo 421, San Luis Lima - Perú. Telefono: 983 481 769 www.nutritec.biz

FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD. 9th Floor, No. 58,Nanhu Road, Nanjing. China

Importador y distribuidor: NUTRITEC COMPANI S.A.C

Calle Felipe Santiago Crespo 421, San Luis Lima - Perú. Telefono: 983 481 769 www.nutritec.biz

CONTENIDO NETO: 1 kg

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilados.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUIMICO: Cianoacetamida (Cymoxanil) y Ditiocarbamato (Mancozeb)
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrale la etiqueta.
- En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua. No provoque el vómito. No dar de beber agua al paciente inconsciente.
- En caso de inhalación colocar a la víctima en una zona con aire fresco.
- Aplicar respiración artificial si la respiración desciende o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. Cuidado que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

NUTRITEC COMPANI S.A.C.: 01 3246534

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino, dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURA-RANCHA es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos Mancozeb (fungicida de contacto) y Cymoxanil (fungicida sistémico), se utiliza de manera preventiva, curativa y en pos-infección, además es erradicante.

Preparación:

Hacer una mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CURA-RANCHA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Table with 8 columns: CULTIVOS, NOMBRE COMÚN, NOMBRE CIENTÍFICO, Kg /200 L, Kg/ha, PC (días), Cymoxanil, Mancozeb. Rows include CEBOLLA, PAPA, QUINUA, and VID.

\*LMR: Límite máximo de residuos

\*PC: Periodo de carencia

\*ppm: Partes por millón

\*n.d.: no determinado

