

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# GATTEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

### Composición:

Flutianil ..... 50g/L  
Aditivos ..... csp1L

Reg. PQUA No. - SENASA

Titular del Registro:

ARYSTALIFESCENCE PERU SAC  
Jr. Caracas226, Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

OAT Agrío Co., Ltd.

1-3-1, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0052  
Japón

Importador y distribuidor:

ARYSTALIFESCENCE PERU SAC  
Jr. Caracas226, Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 500 mL

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Thiazolidine

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

### Teléfonos de Emergencia

SAMU 106  
ARYSTA LIFESCENCE 01-719 4899  
DISPROQUIM 0800-50847

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GATTEN es un fungicida para el control de oidiosis en el cultivo de vid.

GATTEN es efectivo para uso estratégico en programas que intentan minimizar la resistencia a los fungicidas.

GATTEN: Realizar las aplicaciones vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis		PC (días)	LMR. (ppm)
			L/Ha	L/gl 200 L.		
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4-0.5	0.084-0.096	14	0.7

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña como máximo (una campaña/año).

El intervalo entre las aplicaciones no debe ser menor de 7 días, dependiendo de la presión de la enfermedad. El momento de aplicación es desde el desarrollo vegetativo a fructificación (desde cuajado de frutos).

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar hasta 24 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con otros productos. Antes de mezclar con otros plaguicidas se debe realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

