

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

GATTEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMUSIONABLE (EC)

Composición:
Flutianil 50 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 2897 - SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas No. 226, Urb. Oyague, Jesús María - Lima.
Teléfono (01) 5137200



Formulador:
OAT Agrio Co., Ltd.
1-3-1, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-Ku, Tokio 101-0052, Japón

Importador y distribuidor:
AGRITOP S.A.C
Av. Los Gorriones 130 Urb. La Campiña, Chorrillos-Lima, Perú.
Telf. 719-1717 / 719-1718



No. de Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 500 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Este producto es de cuidado. No ingerir. Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión). Evita contacto con la piel y la ropa. Causa daño temporal a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Thiazolidine
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / ARYSTA LIFESCIENCE: (01) 5137200 / CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GATTEN es un fungicida para el control de oidiosis en el cultivo de vid. GATTEN es un fungicida con actividad protectora, curativa, residual y movilidad translaminar, que inhibe la esporulación para el control de oidio en vides, como se indica en el cuadro de instrucciones de uso. GATTEN es efectivo para uso estratégico en programas que intentan minimizar la resistencia a los fungicidas.
GATTEN: Realizar las aplicaciones vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			L/Ha	L/cil 200 L		
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.5	0.084 - 0.096	14	0.7
ARÁNDANO	Oidiosis	<i>Microsphaera penicillata</i>	0.300 - 0.375	0.100 - 0.125	7	0.5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el cultivo de vid, se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña como máximo (una campaña/año). El intervalo entre las aplicaciones no debe ser menor de 7 días, dependiendo de la presión de la enfermedad. El momento de aplicación es desde el desarrollo vegetativo a fructificación (desde cuajado de frutos). Para el cultivo de arándano, se recomienda realizar 1 aplicación por campaña (una campaña/año) cuando se manifieste los primeros síntomas.
PERIODO DE REINGRESO: No ingresar hasta 24 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección.
COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con otros productos. Antes de mezclar con otros plaguicidas se debe realizar una prueba de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

