

"LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

QUILLIBRIUM

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de quillay (*Quillaja saponaria*).....100 g/L

Aditivos.c.s.p. 1 L

REG N°: 115-SENASA-PBA-EV

Titular de registro:

AGROGREEN S.A.C.

Jr. Juan Santos Atahualpa Mza. O

Lote 08 Los Olivos, Lima – Perú

Teléfono: (+51) 7680003

Formulador:

BOTANICAL SOLUTIONS S.p.A.

Av. Quilín 3550, Laboratorio 290,

Macul, Chile.

Teléfono: (+56-2) 227937714

Importador y
distribuido por:



TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.

Lima- Perú.

Teléfono: 612-6565, Fax: 348-1020

R.U.C N° 20307150981

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MANEJO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

-Preparación del producto a aplicar: Mezclar el producto con agua. Llenar el tanque o cilindro de mezcla a la mitad del agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad del producto QUILLIBRIUM de acuerdo a la dosis recomendada y agite, adicione el resto del agua.
-Evite exposición a luz solar directa.

Modo y Mecanismo de acción:

QUILLIBRIUM actúa por contacto con doble mecanismo de acción: induce la respuesta sistémica o inmune en las plantas tratadas (llamada efecto SAR, mediante el cual las plantas desarrollan mecanismos defensivos y de ataque frente a organismos patógenos) e inhibe el desarrollo del hongo patógeno en pre y post cosecha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/Ha)	cc/200L de agua		
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.0		N.A.	N.A.
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5–2.0		N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1.5		N.A.	N.A.
Vid	"Pudrición Ácida"	<i>Aspergillus niger</i> <i>Rhizopus stolonifer</i> <i>Penicillium expansum</i>	1.5–2.0		N.A.	N.A.
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		500	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia (días).

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

QUILLIBRIUM puede ser aplicado en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda repetir las aplicaciones con una frecuencia de 5 a 10 días de acuerdo a las condiciones para la enfermedad. No aplicar Quillibrium más del 50 % de las aplicaciones dirigidas a un blanco biológico por temporada.

Aplicar desde floración a pre cosecha en los cultivos de arándano, fresa y vid. Se recomienda hacer las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde.

Utilizar las mayores concentraciones de Quillibrium en condiciones de mayor presión de la enfermedad.

En palto aplicar a inicios de floración y repetir cada 12-14 días según presión de la enfermedad durante todo el período de floración.

Número de aplicaciones: 6 aplicaciones

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta que la nube de aspersión se haya secado.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer mezclas en el tanque. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

QUILLIBRIUM no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIONES DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

-No permita animales en las zonas tratadas.

-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

-No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

