"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Hacer tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia.
TODO AGRÍCOLA S.A.: 062 - 5261114
SAMU 106

THODOGIBE® 5LS

(ÁCIDO GIBERELICO)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ácido Giberélico..... 50.00 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1,0 L.

Reg. PBUA N°182 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TODO AGRICOLA S.A.
FORMULADOR: TODO AGRICOLA S.A.
DISTRIBUIDOR: TODO AGRICOLA S.A.
Jr. Mayro 157 - Huánuco
Teléfono: 062 - 52 6111
RUC Nº 20120705866

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **20 ml.**
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **INFLAMABLE**

MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
THODOGIBE® 5% SL, es una fitohormona que se comporta como regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que estimula la brotación, refuerza la dominancia apical , estimula el crecimiento de hojas, estimula el crecimiento de yemas laterales, mejora la floración e induce el raelo de flores, en vid se encarga de alargar el escobajo, aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo o la cosecha y hace crecer a los enanos genéticos.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (%)	UAC (dias)	LMR ppm
Vid	**1ra.**: Con racimos de 3 a 13 cm. de largo. **2da.**: Con 50 a 70% de floración. **3ra.**: 2 semanas después de la floración.	0.03-0.05 0.03-0.05 0.03-0.05	---- ---- ----	---- ---- ----

LMR = Límite máximo de residuos.
PC = Período de carencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Disolver en 100 litros de agua la dosis recomendada de **THODOGIBE® 5% SL**, luego completar hasta los 200 litros.

PERÍODO DE REINGRESO:
Después de las aplicaciones es recomendable contemplar un periodo de reingreso de los trabajadores de 12 horas.

Presentación Etiqueta x 20 ml.
(medidas 14.5 x 6 cm.)

PARA ABRIR COLOQUE BAJO LA PESTAÑA SU DEDO Y DESLICELO HACIA AMBOS LADOS

THODOGIBE® 5LS

(ÁCIDO GIBERELICO)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ácido Giberélico..... 50.00 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1,0 L.

Reg. PBUA N°182 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TODO AGRICOLA S.A.
FORMULADOR: TODO AGRICOLA S.A.
DISTRIBUIDOR: TODO AGRICOLA S.A.
Jr. Mayro 157 - Huánuco
Teléfono: 062 - 52 6111
RUC Nº 20120705866

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **20 ml.**
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **INFLAMABLE**

MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Hacer tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia.
TODO AGRÍCOLA S.A.: 062 - 5261114
SAMU 106

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
THODOGIBE® 5% SL, es una fitohormona que se comporta como regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que estimula la brotación, refuerza la dominancia apical , estimula el crecimiento de hojas, estimula el crecimiento de yemas laterales, mejora la floración e induce el raelo de flores, en vid se encarga de alargar el escobajo, aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo o la cosecha y hace crecer a los enanos genéticos.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (%)	PC (dias)	LMR ppm
Vid	**1ra.**: Con racimos de 3 a 13 cm. de largo. **2da.**: Con 50 a 70% de floración. **3ra.**: 2 semanas después de la floración.	0.03-0.05 0.03-0.05 0.03-0.05	---- ---- ----	---- ---- ----

LMR = Límite máximo de residuos.
PC = Período de carencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Disolver en 100 litros de agua la dosis recomendada de **THODOGIBE® 5% SL**, luego completar hasta los 200 litros.

PERÍODO DE REINGRESO:
Después de las aplicaciones es recomendable contemplar un periodo de reingreso de los trabajadores de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:
THODOGIBE® 5% SL, es compatible con productos de uso común.
Incompatible con caldos de reacción alcalina y soluciones que contengan cloro.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el "cuadro de usos".
THODOGIBE® 5% SL, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino, dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Presentación Caja x 20 ml.
(medidas 5 x 9 x 3.5 cm.)