

270 mm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Arylpicolinato; Aryloxfenoxipropionate.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Peru SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**Xevelo™**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Florpyrauxifen-benzyl ..... 12 g/L  
 Cyhalofop-butyl ..... 160 g/L  
 Aditivo ..... c.s.p. 1L

Reg PQUA N°

**Titular del Registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.**  
 Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
 Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco, Lima, Perú.

**FORMULADO POR:**

**Corteva Agriscience LLC.**  
 9330 Zionsville Road  
 Indianapolis, IN 46268. EE.UU.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**FARMEX S.A.**  
 Calle Dean Valdivia 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 Litro.**

**LOTE No.:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

©™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.



#####

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**XEVELO™** es un herbicida sistémico post-emergente controla malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas de importancia económica presentes en el cultivo de arroz. **XEVELO™** ofrece una adecuada selectividad al cultivo tanto en sistemas de siembra directa con semilla tapada o destapada y de trasplante. Sus ingredientes activos con modo de acción diferente (Florpyrauxifen-benzyl es miembro de la familia química arylpicolinato, dentro del grupo de las auxinas sintéticas y Cyhalofop butyl pertenece al grupo químico Aryloxfenoxipropionate), amplían el espectro de control y son una herramienta importante para el manejo de resistencia.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		DOSIS L/Ha(*)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	1.8 a 2.0	60	0.02 <sup>1</sup> 0.4 <sup>2</sup>
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>			
	Lechera	<i>Cyperus esculentus</i>			
	Oreja de ratón	<i>Heteranthera reniformis</i>			
	Gramma	<i>Leptochloa uninervis</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>				

(\*) Gasto de agua 230 L/Ha      <sup>1</sup> Florpyrauxifen-Benzyl      <sup>2</sup> Cyhalofop butyl

**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicación de Xevelo de manera post-emergente temprana en malezas con 2 a 4 hojas y 5 a 10 cm de altura; en etapa de macollamiento del cultivo de arroz (formación de nuevos tallos en forma progresiva, durante el estado vegetativo), aproximadamente a los 22 días después del trasplante o emergencia del cultivo.

Realizar una aplicación por campaña, una campaña por año.  
 Realizar calibración de equipos antes de la aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar 12 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD**

- **XEVELO™** es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso común en el cultivo del arroz. Sin embargo, se recomienda hacer una premezcla antes de su utilización.
- No se recomienda la mezcla de tanque con productos que contengan bispyribac-sodio o propanil ya que se puede presentar antagonismo en el control de algunas malezas.
- Se recomienda el uso de correctores de pH o dureza para el agua de aplicación en caso de ser necesario.

**FITOTOXICIDAD:** **XEVELO™** muestra una adecuada selectividad al cultivo del arroz si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Evite aplicaciones sobre arroz de menos de 3 hojas de desarrollo.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

120 mm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



1. ÁREA DE IMPRESIÓN

Área de silencio del troquel (2 mm) Para garantizar que el troquel no corte textos o elementos impresos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA