

2,0 ± 0,5

19,5 ± 0,5

2,0 ± 0,5

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Mc - Hamer

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Mancozeb ..... 640 g/kg  
 Cymoxanil ..... 80 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2862 - SENASA



**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**  
**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**  
 Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A  
 Z.I. El Agustino. Lima - Perú.  
 Telf.: (01) 644-9297

**Formulado por:**  
**ANHUI FENGLE AGROCHEMICAL CO., LTD.**  
 4 Chuangye Road, Hefei,  
 P.R. China 230031.

**Contenido Neto: 500 g**

N° de Lote:  
 F. de Form.:  
 F. de Venc.:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evítase el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Acetamidas + Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, provoquese el vomito, siempre que el paciente este consciente.
- No tiene antidotos específicos.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**SAMU: 106**  
**SICSAC: (01) 644-9297**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MC-HAMER** es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple.  
**MC-HAMER** es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta.  
**MC-HAMER** tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MC-HAMER** se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200L		
PAPA	Rancha o Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.0	0.5	14	a) 0.05 b) 0.3

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos  
a) Cymoxanil b) Mancozeb



32,0 ± 0,5

4,5