

SIZE: 14.5 X 14.5 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# UNILETICA

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Uniconazol-p.....50 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

RCP N° 092 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.**

Av. El Polo N° 401, Of. N° 610 Centro Comercial Monterrico  
Surco, Lima, Perú. rainbowagro@rainbowagro.com

**FORMULADOR:**

**NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD.**

Room, 2101, Overseas chinese Plaza, N° 1, North Daqiao Road, Nanjing. China  
Teléfono: + 0086-25-58630255

**IMPORTADOR:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.**

Av. El Polo N° 401, Of. N° 610 Centro Comercial Monterrico  
Surco, Lima, Perú. rainbowagro@rainbowagro.com



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
**Contenido Neto : 5 L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

SIZE: 14.5 X 14.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos; use protección ocular durante la mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto, quítese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

**En caso de EMERGENCIAS llamar a:**

**Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
  - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo.
  - Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
  - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del productos o envases vacíos. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**UNILETICA** es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelina (hormonas responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de los futuros frutos cuajados de palta.

**UNILETICA** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo                          | Modo de Acción                                                                                                                                                                                               | Dosis   |         | PC | LMR  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                              | %       | L/Ha    |    |      |
| Palto<br><i>Persea americana</i> | Aplicar en la época de floración, cuando se tenga entre 40 a 50 % de flores.<br>En pulverizaciones de gotas finas en forma de lluvia o rocío, al follaje y direccionado a los brotes, sin llegar al chorreo. | 0.8-1.0 | 4.8-6.0 | 14 | 0.01 |

**PC:** Periodo de carencia en días      **LMR:** Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

- Realizar 1 aplicación por campaña.
- Aplicar la menor dosis en árboles jóvenes, la mayor dosis en árboles de 5 años a más.
- Como máximo aplicar 6.0 L/ha.
- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

- Puede reingresar al área tratada, 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

UNILETICA es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."*

