“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Sempra®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Halosulfuron methyl ..... 750 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 2930-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SUMMITAGRO

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:
NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 103-61 19 Japón
Teléfono: 81 (0) 3-4463-8300

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **100 gramos**
Fecha de Vencimiento :

® **Marca Registrada**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
– Este producto es de cuidado, NO INGERIR.
– Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
– Causa irritación moderada a los ojos.
– No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
– Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
– Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
– No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
– Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
– Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
– Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
– Grupo químico: Sulfonilúreas
– En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
– En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
– En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
– En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
– En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869 / SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
– Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
– Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
– No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
– No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
– Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
– Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
– El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
– En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SEMPRA® es un herbicida de acción sistémica para el control post-emergente de malezas ciperaceas. Es absorbido tanto por el sistema radicular, brotes y la superficie de las hojas y luego es traslocado hacia los órganos vegetativos causando el cese del crecimiento y posterior muerte de los tejidos meristemáticos donde actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, deteniendo la división celular y el crecimiento de las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para el cultivo de arroz se recomienda realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerándose 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de organofosforados y aceites. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD
SEMPRA® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL
“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	“Coquito”	*Cyperus rotundus*	0.05 - 0.06	119	0.01

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) **P.C.:** Periodo de Carencia

1.50 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA