

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada. Puede causar irritación ocular temporal con lagrimeo o visión borrosa.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Puede ser peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No almacene en casa de habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y careta), y para ingresar al área tratada.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Diamidas Antranilicas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con abundante agua. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte un médico si es necesario. En caso de contacto con la piel, lave las manos con abundante agua y jabón. Consulte un médico si es necesario.
- En caso de inhalación, aleje al paciente del sitio contaminado. Consulte un médico si es necesario.
- En caso de ingestión, seguir tratamiento sintomático. Consulte un médico si es necesario. Nunca administrar nada por la boca ni induzca el vómito a una persona inconsciente.
- ANTIDOTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481
CISPROQUIM: 080-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos invertebrados.
- No contaminar ríos, estanques con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MiraprinTM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Chlorantraniliprole..... 200 g/l
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2943 - SENASA

Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 208, Interior
705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas.
Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulado por:

E.I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta
USA

Importado y Distribuido por:

FARMEX
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400

CONTENIDO NETO: 1 Litro

No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada de FMC

A10002557-22001013-2001

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Miraprin pertenece al grupo de insecticidas de las adiaminas antranilicas (Grupo 28 - IRAC), para el grupo 28 de insecticidas se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo para prevenir fenómenos de resistencia. Miraprin es un insecticida con un novedoso mecanismo de acción que actúa en los receptores de rianodina, llevando a un agotamiento en el almacenamiento interno del calcio, que deteriora la regulación de las contracciones musculares. Los insectos expuestos a Chlorantraniliprole, exhiben en general letargia y parálisis muscular seguida posteriormente por la muerte. También tiene actividad de contacto aunque es mas eficaz a través de la ingestión del material tratado. Miraprin actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que pare de alimentarse, se paralice y muera en un periodo de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse en el momento más susceptible del insecto, típicamente huevo o larvas recién eclosionadas, antes de que las poblaciones alcancen niveles dañinos.

MÉTODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda utilizar equipos de aplicación foliar, de uso común en las fincas como bombas de mochila manual o de corriente de aire, previa calibración, procurando lograr la mejor cobertura posible sin llegar al punto de escorrentía. Los volúmenes promedio de agua utilizados por cultivo en los diferentes ensayos fueron los siguientes: Algodón: 700 l/ha; Pimiento: 650 l/ha; Tomate: 500 l/ha; Espárrago: 700 l/ha; Alcachofa: 450 l/ha; Papa: 200-500 l/ha; Arroz: 230 l/ha; Maíz: 420 l/ha y Arándanos: 400 l/ha.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES PARA SU USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C. (días)	L.M.R. ¹ (ppm)
Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Gusano perforador (<i>Heliothis virescens</i>)	0.15	21	0.3
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Pollilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	0.10	1	0.6
Páprika (<i>Capsicum annuum</i>)	Gusano perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	0.10-0.15	1	0.6
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i> L)	Gusano perforador (<i>Heliothis virescens</i>)	0.15	40	0.01
	Gusano del follaje (<i>Spodoptera eridania</i>)	0.15		
	Mosquilla del brote (<i>Prodiplaxis longifolia</i>)	0.15		
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	Gusano del follaje (<i>Spodoptera eridania</i>)	0.15	3	0.3
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gorgojo de los Andes (<i>Premnotypes suturalis</i>)	0.2-0.3	14	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.075-0.1	45	0.4
	Gusano barrenador de la caña (<i>Diatraea saccharalis</i>)	0.075-0.1		
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.1	21	0.02
Arándanos	<i>Heliothis virescens</i>	0.15-0.2	1	1

PC.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos y Tolerancias de importación (IT) para los cultivos tratados con Miraprin pueden no estar establecidos en algunos países. PERÍODO DE REINGRESO: Ingrese al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: (VER FOLLETO ADJUNTO)
COMPATIBILIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)
FITOTOXICIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)
RESPONSABILIDAD CIVIL: (VER FOLLETO ADJUNTO)



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



270 mm

33mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 105 FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481 CISPROQUIM: 080-5-0847 Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 239, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERÚ FMC Formulado por: E.I. du Pont de Nemours and Company Valdosta Manufacturing Center 2509 Rocky Ford Road Valdosta - USA	Miraprin® PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA [INSECTICIDA AGRÍCOLA] Suspensión Concentrada (SC) Composición: Chlorantraniliprole..... 200 g/l Aditivos..... c.s.p. 1 L Registro PQUA N° 2943 - SENASA NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO ® Marca Registrada de FMC LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" CONTENIDO NETO: 30 ml No. Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento: Importado y Distribuido por: Farmex FARMEX Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400
--	---	--

131mm

45mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481 CISPROQUIM: 080-5-0847 Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 239, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERÚ FMC Formulado por: E.I. du Pont de Nemours and Company Valdosta Manufacturing Center 2509 Rocky Ford Road Valdosta, USA	Miraprin® PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA [INSECTICIDA AGRÍCOLA] Suspensión Concentrada (SC) Composición: Chlorantraniliprole..... 200 g/l Aditivos..... c.s.p. 1 L Registro PQUA N° 2943 - SENASA NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO ® Marca Registrada de FMC LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" CONTENIDO NETO: 100 ml No. Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento: Importado y Distribuido por: Farmex FARMEX Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400
---	---	--

186 mm

56mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481 CISPROQUIM: 080-5-0847 Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 239, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERÚ FMC Formulado por: E.I. du Pont de Nemours and Company Valdosta Manufacturing Center 2509 Rocky Ford Road Valdosta, USA	Miraprin® PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA [INSECTICIDA AGRÍCOLA] Suspensión Concentrada (SC) Composición: Chlorantraniliprole..... 200 g/l Aditivos..... c.s.p. 1 L Registro PQUA N° 2943 - SENASA NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO ® Marca Registrada de FMC LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" CONTENIDO NETO: 200 ml No. Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento: Importado y Distribuido por: Farmex FARMEX Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400
---	---	--

190 mm



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
RECOMENDACIONES DE USO:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
MÉTODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
COMPATIBILIDAD:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
FITOTOXICIDAD:	(VER FOLLETO ADJUNTO)
RESPONSABILIDAD CIVIL:	(VER FOLLETO ADJUNTO)

5mm