

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
No re-emplazar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: estrobilurina (Azoxytrobin). Triazol (Cyproconazole). Benzimidazole (Thiabendazole).
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la boca, si la persona esta inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar al paciente del área tratada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración si fuera necesario.
Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
MONTANA: 419-3000
CETOX: 970142321

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

“Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes” “Evitar la deriva por el viento.”
“Peligroso para organismos acuáticos.”
“No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.”
“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.”
“Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.”
“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.” “No permitir animales en el área tratada.”
“El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.”
“El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.”
“En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.”

Triforce®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Azoxytrobin 250.0 g/L
Thiabendazole 200.0 g/L
Cyproconazole 120.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA
Titular del Registro, Formulado y Distribuido por:

MONTANA

Av. Javier Prado Este N° 6210.
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIFORCE es un fungicida sistémico y translaminar de amplio espectro, que combina la acción de tres moléculas de diferentes mecanismos de acción para un control rápido y prolongado. Se recomienda su uso de manera preventiva y curativa; debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena distribución y cobertura del producto sobre el cultivo de arroz.

TRIFORCE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agita hasta obtener una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	“Pyricularia”	Pyricularia oryzae	0.30	45	(a)5 (b)0.01 (c)0.1

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos
(a)Azoxytrobin (b)Thiabendazole (c)Cyproconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TRIFORCE debe aplicarse de manera preventiva o con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad en los momentos de mayor susceptibilidad en el cultivo como máximo macollamiento, punto de algodon (“embuchamiento”) e inicio de espigado.
Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año. Se recomienda la rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

TRIFORCE no es fitotóxico en el cultivo indicado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

