

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: estrobilurina (Azoxystrobin). Triazol (Cyproconazole), Benzimidazole (Thiabendazole).
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la boca, si la persona esta inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar al paciente del área tratada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración si fuera necesario.
Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
MONTANA: 419-3000
CETOX: 970142321

Triforce®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin 250.0 g/L
Thiabendazole 200.0 g/L
Cyproconazole 20.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro, Formulador y Distribuido por:

MONTANA

Av. Javier Prado Este N° 6210 Of. 401, La Molina. Lima-Perú
Teléfono: 419-3000

Contenido Neto: 300 mL.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIFORCE es un fungicida sistémico y translaminar de amplio espectro, que combina la acción de tres moléculas de diferentes mecanismos de acción para un control rápido y prolongado. Se recomienda su uso de manera preventiva y curativa, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena distribución y cobertura del producto sobre el cultivo de arroz.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	0.30	45	(a)5 (b)0.01 (c)0.1

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

(a)Azoxystrobin (b)Thiabendazole (c)Cyproconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TRIFORCE debe aplicarse de manera preventiva o con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad en los momentos de mayor susceptibilidad en el cultivo como máximo macollamiento, punto de algodón ("embuchamiento") e inicio de espigado.
Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año. Se recomienda la rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

TRIFORCE no es fitotóxico en el cultivo indicado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

