

# SIZE: 14.0 X 28.0 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Casa irritación moderada a los ojos
- Este producto es dañino por Ingestión y por inhalación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar a la área tratada después de las 24 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Mantener el producto alejado del fuego
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazoles
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo)
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. Llevar al médico.
- En caso de ingestión, no induce al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- Telefono de emergencia:  
SAMU :106
- Telefono del titular:  
RAINBOW AGROSCENCES: 01-7139960

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas
- Tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre no permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# ETÉREO-AG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

Gránulos dispersables (WG)

## COMPOSICION

Fipronil..... 800 g/kg  
Aditivos ..... csp 1kg

Registro PQUA N° - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**RAINBOW AGROSCIENCIAS SAC**  
Av. El Polo 401, Oficina 610.  
Santiago de Surco. Lima 33. Perú.  
Teléfono: (511) 713-9960

**FORMULADO POR:**  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**  
Binhai Economic Development Area  
Weifang Shandong 262737 - China  
Teléfono: 86-531-88875222 / 88875231  
E-mail: rainbowchem@rainbowchem.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**  
**RAINBOW AGROSCIENCIAS SAC**  
Av. El Polo 401, Oficina 610.  
Santiago de Surco. Lima 33. Perú.  
Teléfono: (511) 713-9960

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto : 20 Kg  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ETÉREO-AG** es un insecticida de amplio espectro, tóxico por el contacto e ingestión .

Moderadamente sistémico que, en algunos cultivos, puede usarse en aplicación al suelo o semillas. Tiene una excelente acción residual luego de aplicaciones foliares.

Preparación y aplicación:

1. Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme.
  2. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
  3. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
3. La absorción de **ETÉREO-AG** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	80	21	0.1

P.C. = Período de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica hasta dos veces por temporada o campaña/año.  
Aplicar al inicio de detección de la plaga.

## PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas

## COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción ácida o alcalina fuerte.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Tambor