

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

11-06-2024

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SERENDIPIA-AG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

Composición:

Cyprodinil	375 g/kg
Fludioxonil	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

PQUA N° 2935 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura -Paita -
Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona
Especial de Desarrollo Piura-Paita-Paita, Perú.
Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas
y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

BOLSA TRILAMINADA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilino pirimidine (cyprodinil), Phenyl pyrrole (fludioxonil).

- En caso de Intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y la mostrar etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de vómito espontáneo, haga que víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vómito, enjuáguese la boca y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico mas cercano y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona de área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU :106
ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA: (01) 2663828

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SERENDIPIA-AG® es un fungicida específico para combatir el moho gris (*Botrytis cinerea*); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.

SERENDIPIA-AG® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (Kg/ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
PIMIENTO	*Moho gris*	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7* 7**	1.5* 0.2**
VID	*Moho gris*	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	7* 7**	3.0* 4.0**
ARÁNDANO	*Erysiphe*	<i>Erysiphe elevata</i>	0.7 - 1.0	7* 7**	8.0* 4.0**

P.C.: Periodo de Carencia LMR: Limite maximo de residuos *Cyprodinil ** Fludioxonil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar SERENDIPIA-AG® dirigido al follaje del cultivo de manera preventiva o en los inicios de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables.
- En el cultivo de vid se recomienda 1 aplicación por campaña como máximo, 1 campaña por año.
- En el cultivo de pimiento se recomienda 1 aplicación por campaña como máximo, 2 campañas por año.
- En el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 21 días, 1 campaña por año. Aplicar en etapa de desarrollo de hojas del cultivo y utilizar un gasto de agua de 600 L/ha.
- Es importante rotar con otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SERENDIPIA-AG® es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señadas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

