

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

05-07-2024

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**SERENDIPIA-AG**

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Gránulo Dispersable (WG)

**Composición:**

Cyprodinil .....	375 g/kg
Fludioxonil .....	250 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p. 1kg

**PQUA N° 2935 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura -Paita -  
Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.  
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
https://www.rainbowagro.com/

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

**NovAgro-AG®**

*Ayudamos a producir frutas y hortalizas sanas para  
las familias, el ambiente y el agricultor*

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **1Kg**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

BOLSA TRILAMINADA

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

05-07-2024

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico:** Anilino pirimidine (cyprodinil), Phenylpyrrole (fludioxonil).
- En caso de Intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y la mostrar etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de vómito espontáneo, haga que víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vómito, enjuáguese la boca y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico mas cercano y mostrar la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona de área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU :106**

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA: (01) 2663828**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SERENDIPIA-AG® es un fungicida específico para combatir el moho gris (*Botrytis cinerea*); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias. SERENDIPIA-AG® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (Kg/ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PIMIENTO	*Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7	1.5* 0.2**
VID	*Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	7	3.0* 4.0**
ARÁNDANO	*Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7	8.0* 4.0**
	*Erysiphe	<i>Erysiphe elevata</i>	0.7 - 1.0	7	8.0* 4.0**

P.C.: Período de Carencia LMR: Limite maximo de residuos \*Cyprodinil \*\* Fludioxonil

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar SERENDIPIA-AG® dirigido al follaje del cultivo de manera preventiva o en los inicios de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables.
- En el cultivo de vid se recomienda 1 aplicación por campaña como máximo, 1 campaña por año.
- En el cultivo de pimiento se recomienda 1 aplicación por campaña como máximo, 2 campañas por año.
- En el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 21 días, 1 campaña por año. Aplicar en etapa de desarrollo de hojas del cultivo y utilizar un gasto de agua de 600 L/ha.
- Es importante rotar con otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

SERENDIPIA-AG® es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



BOLSA TRILAMINADA